

DESCRIPTION DE DEUX NOUVEAUX CERCOPIDES
PROVENANT DE L'ARGENTINE

PAR LE

DR. V. LALLEMAND

(Uccle, Belgique)

Parmi quelques homoptères d'Argentine que Mr. Christensen, de la Division de Zoologie Agricole du Ministère de l'Agriculture de Buenos Aires, a bien voulu m'envoyer, se trouvent deux nouvelles espèces de cercopides, dont voici ci-dessous la description :

CLASTOPTERA ARGENTINA N. SP.

Tête jaune; bord antérieur du vertex, stries transversales du clypéus et du proclypéus, une ligne longitudinale, médiane, sur ce dernier: bruns. Pronotum brun, sauf: une ligne longitudinale, médiane, les bords latéro-postérieurs et postérieur, ainsi qu'une bande, parallèle a bord antérieur, située un peu en arrière de celui-ci, sur certains exemplaires cette bande peut s'élargir et atteindre le bord antérieur. Ecusson jaune, au centre de sa base, un triangle et à la partie médiane une bande transversale: brun clair; lorsque ces tache et bande sont très marquées, elles peuvent se souder et le dessin change et on voit alors trois taches jaunes séparées par un espace brun clair: 2 latéro-antérieures et une postérieure. Elytres bruns, sur ceux-ci, une bande jaune oblique, partant de la moitié antérieure de l'écusson, elle se dirige en arrière et en dehors, traverse le clavus et s'étend sur le corium jusqu'au médian, en face de son extrémité, près du bord externe, une tache jaune; la partie postérieure devient plus claire, plus transparente et même presque hyaline, la nervure périphérique, l'extrémité du cubitus et du médian, la tache calleuse, sont brunes; en avant et sur les côtés de la tache calleuse les nervures sont jaunes. Sternum, pattes: ocre. Milieu du mésosternum, extrémité du rostre, bandes longitudinales sur les cuisses, taches sur les tibias, abdomen: bruns. Epines des

tibias et des tarses brun noir. Sur le pronotum une quinzaine de stries transversales dont quelques unes irrégulières. Bord antérieur du vertex en angle très obtus, presque arrondi. Clypéus, vu d'en haut, à peine visible. La forme générale est plutôt allongée.

Longueur: A peu près 3 mm.

Habitat: Argentine, San Isidro, Buenos Aires, Isla Martín García; Tigre.

MANECPHORA CHRISTENSENI N. SP.

Tête, pronotum et écusson: noir verdâtre; proclypéus, premier et base du second article du rostre, hanches antérieures, mésosternum (dans sa plus grande partie), métasternum et ventre: rouge carmin; second article du rostre (sauf sa base), une grande tache de chaque côté de la ligne médiane du mésosternum, ainsi qu'une aux bords latéraux de chaque segment abdominal, pattes antérieures et médianes: noirs; pattes postérieures rouge carmin, les épines, l'extrémité des tibias et les tarses sont noirs; élytres noirs, à base du corium carmin, portant cinq taches dont la coloration varie du jaune orange au rouge carmin; la première en forme de bande longitudinale longue jusqu'à la pointe de l'écusson le bord interne, dont elle s'éloigne ensuite; la deuxième, ovale et la quatrième, oblique en arrière et en dedans, au bord externe; la troisième, au milieu du corium, au niveau de l'extrémité de la suture clavo coriale occupe la pointe du clavus et la région voisine du corium; la coloration carmin de la base du corium peut former une bande longitudinale s'étendant jusqu'à la première tache du bord externe. Ailes en fumées, à nervures noires, à base rouge. Face supérieure de l'insecte recouverte d'une villosité dense, pâle.

Sur la moitié antérieure du pronotum une très faible carène médiane; sur le tiers basal des élytres, le médian et le cubitus sont soudés; deux épines sur les tibias postérieurs, une petite vers la base et une forte vers l'extrémité; clypéus, vu de côté, arrondi, à forte carène longitudinale.

Longueur. — 9 mm.

Habitat. — Argentine: Córdoba (Yacanto); Salta.

A première vue ressemble beaucoup à *Tomaspis astralis* Distant (Ann. Mag. nat. hist., 8, VII, 1909), s'en différencie surtout par la forme du clypéus.